

JAK POSTĘPOWAĆ PO ZABIEGU CHIRURGICZNYM NA PAZNOKCIU

PACJENT:

DATA I MIEJSCE ZMIANY OPATRUNKU:

DATA I MIEJSCE USUNIĘCIA SZWÓW:

- Znieczulenie miejscowe przestaje działać zwykle około godziny po zabiegu. Po powrocie do domu zażyj 1 tabletkę Paracetamolu, kolejną po 6-8 godzinach. Jeśli nadal odczuwasz ból dodaj Pyralginę lub Ketonal zgodnie z zaleceniami chirurga.
- Przez 48 godzin po zabiegu kończyna musi być uniesiona! Zapobiega to pulsującemu bólowi i obrzękowi.
- Pierwsza zmiana opatrunku ma odbywać się zwykle po 72 godzinach. Nie jest bolesna. Nowy opatrunek będzie dużo mniejszy i wygodniejszy. Będziesz mógł/ mogła założyć wygodne obuwie i normalnie się poruszać. Przez 3-4 tygodnie unikaj sportu i szczególnie dbaj o higienę.
- W niektórych przypadkach sączenie po zabiegu może utrzymywać się do 6 tygodni.

Codzienna samodzielna zmiana opatrunku:

- umyj i zdezynfekuj ręce
- obficie zmocz opatrunek Octeniseptem
- delikatnie go zdejmij
- obficie polej miejsce operowane Octeniseptem i poczekaj aż wyschnie
- nałóż maść lub opatrunek specjalistyczny zalecony przez chirurga
- przykryj jałowym gazikiem lub plastrem



Dr Maj

Powiadom o następujących zdarzeniach:

- rezygnacji z zabiegu
- otrzymania jakichkolwiek zaleceń od innego lekarza
- silnym bólu/ gorączce/ zaczerwienieniu w okolicy zaplanowanej do zabiegu

dzwoniąc pod numer:

lub do chirurga: 606 457 194